

ცხრილი N1

კლინოფთილოლიტის შემცველი ტუფების გავლენა მდელოს ყავისფერ ნიადაგზე
მოყვანილ სტაფილოს ბიომეტრიულ მაჩვენებლებზე

N	ცდის სქემა	ნაყოფის წონა გ-ში			ნამატი საკონტროლს-თან %-ში	ნაყოფის სიგრძე	ნამატი		ნაყოფის სიგანე	ნამატი საკონტროლსთან შედარებით		ფოთლის სიგრძე	ნამატი საკონტროლსთან	
		I	II	საშუალო			სმ	%		სმ	%		სმ	%
1	აბსოლიტური ფონი	18,2	19,2	18,6		9,6			8			10,5		
2	საკონტროლო – ნიადაგი +N _{0,15} P _{0,15} K _{0,10}	19,6	21,0	20,3		10,2			9,7			11,7		
3	საკონტროლო +3გ ცეოლითი	21,9	22,3	22,1	8	12,1	1,9	18	10,2	0,5	5,15	12,8	1,1	9,4
4	საკონტროლო +8გ ცეოლითი	23,9	24,1	23,5	12	13,6	3,4	33	10,8	1,1	11,3	14,0	2,3	19,6
5	აბსოლიტური ფონი +3გ ცეოლითი	18,3	20,1	19,2		9,9			9,1			10,9		
6	აბსოლიტური ფონი +8გ ცეოლითი	19,0	20,2	19,6		10,3			9,5			11,3		